

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
САЛАМАТТЫК САКТОО
МИНИСТРИГИНИН
АЛДЫНДАГЫ ДАРЫ КАРАЖАТТАРЫ
ЖАНА МЕДИЦИНАЛЫК БУЮМДАР
ДЕПАРТАМЕНТИ



ДЕПАРТАМЕНТ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

720044, Кыргыз Республикасы
Бишкек ш., 3-линия көчөсү, 25
Тел: (0312) 21-92-86, тел. факс: (0312) 21-05-08,
E-mail: dlsmi@pharm.kg

720044, Кыргызская Республика
г. Бишкек, ул. 3-линия, 25
Тел: (0312) 21-92-86, тел. факс: (0312) 21-05-08,
E-mail: dlsmi@pharm.kg

06.01.2021 № 11-10/3

На № _____ от _____

**Информационное письмо
для специалистов здравоохранения!**

Г

Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного препарата.

**Тиазидные и тиазидоподобные
диуретики – риск
хориоидального выпота**

Уважаемые специалисты системы здравоохранения,

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при МЗ КР информирует Вас о новом риске развития хориоидального выпота при применении тиазидных и тиазидоподобных диуретиков.

Проведенный обзор и анализ базы данных нежелательных реакций *Eudravigilance*, данных медицинской литературы, показал о риске хориоидального выпота при применении тиазидных и тиазидоподобных диуретиков (моно- и комбинированных лекарственных средств).

Сульфонамиды или производные сульфонамида, могут вызывать идиосинкрезические реакции, приводящие к развитию хориоидального выпота с дефектом поля зрения, острой кратковременной миопии и острой закрытоугольной глаукоме. Симптомы включают потерю остроты зрения или боль в глазах, которые возникают, как правило, в течение нескольких часов или недель после начала приема лекарственного средства. При отсутствии лечения острая закрытоугольная глаукома может привести к необратимой потере зрения! При проявлении симптомов необходимо как можно скорее прекратить прием препарата. Если внутриглазное давление остается неконтролируемым, может потребоваться неотложное медикаментозное лечение или хирургическое вмешательство. Факторами риска развития острой закрытоугольной глаукомы могут быть аллергические реакции на сульфонамиды или пенициллин в анамнезе.

Лекарственные средства, содержащие бендрофлуметиазид, циклетанин, клопамид, циклопентиазид, гидрофлуметиазид, метипамид, метолазон, ксипамид (не сообщалось о хориоидальном выпоте при применении вышеуказанных лекарственных средств, но рассматривается как классовый эффект).

Литература:

*PRAC recommendations on signals Adopted at the 9-12 March 2020 PRAC meeting
EMA/PRAC/111214/2020 Corr2,3 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) 6 April
2020 <http://www.ema.europa.eu/>*

Заместитель директора



Ч.М. Мамбеталиева