

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
САЛАМАТТЫК САКТОО
МИНИСТРЛИГИНИН
АЛДЫНДАГЫ ДАРЫ КАРАЖАТТАРЫ
ЖАНА МЕДИЦИНАЛЫК БУЮМДАР
ДЕПАРТАМЕНТИ



ДЕПАРТАМЕНТ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

720044, Кыргыз Республикасы
Бишкек ш., 3-линия көчөсү, 25
Тел: (0312) 21-92-86, тел. факс: (0312) 21-05-08,
E-mail: dlsmi@pharm.kg

720044, Кыргызская Республика
г. Бишкек, ул. 3-линия, 25
Тел: (0312) 21-92-86, тел. факс: (0312) 21-05-08,
E-mail: dlsmi@pharm.kg

25.12.2020 № 11-2425/3

На № _____ от _____

**Информационное письмо
для специалистов здравоохранения!**

Новая информация из раздела безопасности использования лекарственного средства

22.12.2020

**Ибупрофен-, кетопрофен-содержащие лекарственные средства –
повышение риска развития серьезных осложнений инфекционных
заболеваний**

Комитетом по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA) по результатам выполненного обзора и анализа накопленных данных было установлено, что в настоящее время невозможно исключить повышенный риск развития осложнений инфекционных заболеваний, при применении лекарственных средств, содержащих ибупрофен и кетопрофен, который обусловлен маскировкой симптомов инфекции. Маскировка признаков и симптомов инфекционного заболевания является известным риском, связанным с применением нестероидных противовоспалительных лекарственных средств (НПВС). Результаты нескольких исследований показали, что данный риск является клинически значимым преимущественно при бактериальной внебольничной пневмонии и осложненной ветряной оспе.

Рекомендации для специалистов здравоохранения.

Применение вышеуказанных лекарственных средств может скрывать признаки и симптомы инфекции, такие как лихорадка и боль. В результате возможна задержка в назначении адекватного лечения инфекции, что может повысить риск развития осложнений. Это наблюдается при бактериальной пневмонии, а также при бактериальной инфекции кожи на фоне ветряной оспы.

При назначении предупреждать:

Если вы принимаете Ибупрофен-, кетопрофен-содержащие лекарственные средства при инфекционном заболевании и отмечаете сохранение или ухудшение симптомов, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Как принимать:

Следует принимать в минимальной эффективной дозе и на протяжении минимально короткого периода, необходимого для облегчения симптомов. Если симптомы инфекции, такие как лихорадка и боль сохраняются или ухудшаются, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Заместитель директора



Ч.М. Мамбеталиева

Литература:

*PRAC recommendations on signals Adopted at the 14-17 April 2020 PRAC meeting
EMA/PRAC/201784/2020 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) 11 May
2020 <http://www.ema.europa.eu/>*