

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
САЛАМАТТЫК САКТОО
МИНИСТРЛИГИНИН
АЛДЫНДАГЫ ДАРЫ
КАРАЖАТТАРЫ ЖАНА
МЕДИЦИНАЛЫК БУЮМДАР
ДЕПАРТАМЕНТИ



ДЕПАРТАМЕНТ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

720044, Кыргыз Республикасы
Бишкек ш., 3- линия көчөсү, 25
Тел: (0312) 21-92-86, тел.факс: (0312) 21-05-08
E-mail: dlsmi@pharm.kg

720044, Кыргызская Республика
г.Бишкек, ул. 3-я линия, 25
Тел: (0312) 21-92-86, тел.факс: (0312) 21-05-08
E-mail: dlsmi@pharm.kg

№ _____

На № _____ от _____

Информационное письмо для
специалистов здравоохранения

17.05.2023

Венлафаксин-содержащие лекарственные препараты – риски серьезных исходов

Уважаемые специалисты системы здравоохранения!


Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при МЗ КР информирует Вас о новом риске серьезных исходов при применении венлафаксин-содержащих лекарственных препаратов.

Комитет по оценке рисков Европейского медицинского агентства (*PRAC EMA*), рассмотрев имеющиеся данные доклинических и клинических исследований, *EudraVigilance* и данные из источников научной литературы, пришел к выводу о наличии возможной причинно-следственной связи между применением венлафаксин-содержащих лекарственных препаратов и риском серьезных исходов.

Пациентам следует рекомендовать не употреблять алкоголь, учитывая его воздействие на ЦНС и потенциальное клиническое ухудшение психических состояний, а также потенциальное неблагоприятное взаимодействие с венлафаксином, включая эффекты, угнетающие ЦНС. Сообщалось о передозировке венлафаксина преимущественно в комбинации с алкоголем и/или другими лекарственными средствами, включая случаи с летальным исходом.

Рецепты на венлафаксин следует выписывать в наименьшем количестве, соответствующем надлежащему ведению пациента, чтобы снизить риск передозировки. Тяжелое отравление может потребовать комплексного неотложного лечения и наблюдения. Поэтому в случае подозрения на передозировку венлафаксином рекомендуется незамедлительно связаться с [например, национальным центром информации о токсикозах, специалистом по отравлениям, в зависимости от страны].

ОФир-21-92-88



Одновременное употребление с алкоголем может привести к сильной усталости и потере сознания, а также усугубить симптомы депрессии и других состояний, таких как тревожные расстройства.

Литература:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/psusa/venlafaxine-cmdh-scientific-conclusions-grounds-variation-amendments-product-information-timetable/00003104/202205_en.pdf

Заместитель директора

К.Т. Бекбоев

ОФир-21-92-88

Чыг. № 10/1798, 22.05.2023



ДОКУМЕНТ ЭЛЕКТРОНДУК САНАРИП
КОЛТАМГАСЫ МЕНЕН БЕКИТИЛГЕН

Кол койгон: Бекбоев К.Т., 22.05.2023