

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
САЛАМАТТЫК САКТОО
МИНИСТРЛИГИНИН
АЛДЫНДАГЫ ДАРЫ
КАРАЖАТТАРЫ ЖАНА
МЕДИЦИНАЛЫК БУЮМДАР
ДЕПАРТАМЕНТИ**

720044, Кыргыз Республикасы
Бишкек ш., 3- линия көчөсү, 25
Тел: (0312) 21-92-86, тел.факс: (0312) 21-05-08
E-mail: dlsmi@pharm.kg



**ДЕПАРТАМЕНТ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

720044, Кыргызская Республика
г. Бишкек, ул. 3-я линия, 25
Тел: (0312) 21-92-86, тел.факс: (0312) 21-05-08
E-mail: dlsmi@pharm.kg

_____ № _____

На № _____ от _____

**Информационное письмо для
специалистов здравоохранения**

23.11.2023

**фамотидин-содержащие лекарственные препараты – риск снижение
эффективности**

Уважаемые специалисты системы здравоохранения!

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при МЗ КР информирует Вас о новом риске снижения эффективности при применении фамотидин-содержащих лекарственных препаратов.

Комитет по оценке риска в сфере фармаконадзора (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, PRAC), входящий в состав Европейского агентства лекарственных средств (European Medicines Agency, EMA), принимая во внимание данные экспертного отчета об оценке периодических обновляемых отчетов по безопасности лекарственных препаратов, содержащих фамотидин, сделал следующие научные выводы:

По возможности следует избегать одновременного применения пероральной суспензии позаконазола с фамотидином, поскольку фамотидин может снижать всасывание пероральной суспензии позаконазола при одновременном применении.

Одновременное применение фамотицина с ингибиторами тирозинкиназы (ТКИ) дазатинибом, эрлотинибом, гефитинибом, пазопанибом может снижать концентрацию ТКИ в плазме крови, что приводит к снижению эффективности, поэтому одновременное применение фамотицина с ними не рекомендуется.

Литература:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/psusa/carbidopa/levodopa-cmdh-scientific-conclusions-grounds-variation-amendments-product-information-timetable/00000548/202210_en.pdf

Заместитель директора

К.Т. Бекбоев