

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
САЛАМАТТЫК САКТОО  
МИНИСТРЛИГИНИН  
АЛДЫНДАГЫ ДАРЫ  
КАРАЖАТТАРЫ ЖАНА  
МЕДИЦИНАЛЫК БУЮМДАР  
ДЕПАРТАМЕНТИ**



**ДЕПАРТАМЕНТ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  
И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ  
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

720044, Кыргыз Республикасы  
Бишкек ш., 3- линия көчөсү, 25  
Тел: (0312) 21-92-86, тел.факс: (0312) 21-05-08  
E-mail: dlsmi@pharm.kg

720044, Кыргызская Республика  
г.Бишкек, ул. 3-я линия, 25  
Тел: (0312) 21-92-86, тел.факс: (0312) 21-05-08  
E-mail: dlsmi@pharm.kg

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Информационное письмо для  
специалистов здравоохранения**

**Симвастатин-содержащие лекарственные препараты – лекарственные взаимодействия, связанные с повышенным риском миопатии и рабдомиолиза при одновременном применении с палбоциклибом и рибоциклибом**

Уважаемые специалисты системы здравоохранения!

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики информирует специалистов здравоохранения о новой информации по безопасности лекарственных препаратов, содержащих симвастатин, касающейся лекарственных взаимодействий с палбоциклибом и рибоциклибом, связанных с повышенным риском развития миопатии и рабдомиолиза при их одновременном применении.

С учётом отчёта Комитета по оценке рисков в сфере фармаконадзора (PRAC) по результатам оценки периодических обновляемых отчётов по безопасности (PSUR) для симвастатина, сформулированы следующие научные выводы.

На основании имеющихся данных о лекарственном взаимодействии между симвастатином и палбоциклибом, а также между симвастатином и рибоциклибом, полученных из научной литературы и спонтанных сообщений (включая случаи с чёткой временной взаимосвязью и положительным эффектом после отмены терапии), а также с учётом правдоподобного механизма взаимодействия, PRAC считает, что причинно-следственная связь лекарственного взаимодействия между симвастатином и палбоциклибом, а также между симвастатином и рибоциклибом, по меньшей мере, является вероятной.

ОФир 21-92-88

№ 10/2226, 15.06.2026



Кол койгон: Джанкорозова М.К., 15.06.2026

- Одновременное применение симвастатина и палбоциклиба не рекомендуется в связи с возможным повышением риска развития миопатии и рабдомиолиза.
- Одновременного применения симвастатина и рибоциклиба следует избегать.

*Литература:*

[https://www.ema.europa.eu/en/documents/psusa/simvastatin-cmdh-scientific-conclusions-grounds-variation-amendments-product-information-timetable-implementation-psusa-00002709-202504\\_en.pdf](https://www.ema.europa.eu/en/documents/psusa/simvastatin-cmdh-scientific-conclusions-grounds-variation-amendments-product-information-timetable-implementation-psusa-00002709-202504_en.pdf)

**Заместитель директора**

**Джанкорозова М.К.**