

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
САЛАМАТТЫК САКТОО  
МИНИСТРЛИГИНИН  
АЛДЫНДАГЫ ДАРЫ КАРАЖАТТАРЫ  
ЖАНА МЕДИЦИНАЛЫК БУЮМДАР  
ДЕПАРТАМЕНТИ



ДЕПАРТАМЕНТ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  
И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ  
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

720044, Кыргыз Республикасы  
Бишкек ш., 3-линия көчөсү, 25  
Тел: (0312) 21-92-86, тел. факс: (0312) 21-05-08,  
E-mail: dlsmi@pharm.kg

720044, Кыргызская Республика  
г. Бишкек, ул. 3-линия, 25  
Тел: (0312) 21-92-86, тел. факс: (0312) 21-05-08,  
E-mail: dlsmi@pharm.kg

*24.12.2021, № 11-2441/3*

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Держателям регистрационных  
удостоверений лекарственных средств,  
из группы НПВС, зарегистрированных на  
территории Кыргызской Республики

*Дополнение к письму от 30.10.2020 «внесения изменений в инструкцию по  
медицинскому применению для нестероидных  
противовоспалительных средств (НПВС)»*

Следующим текстом дополнить раздел «Беременность и лактация»:

Использование нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) примерно через 20 недель или в более поздние сроки беременности может вызвать редкие, но серьезные проблемы с почками у плода. Это может вызвать развитие редких серьезных заболеваний почек у плода, и привести к уменьшению количества околоплодных вод и осложнениям беременности.

Рекомендуется избегать применения НПВС на 20 неделе и в более поздние сроки беременности.

Если лечение НПВС считается необходимым на сроке от 20 до 30 недель беременности, ограничьте его использование минимальной эффективной дозой и самой короткой возможной продолжительностью.

А также следует рассмотреть возможность проведения ультразвукового исследования околоплодных вод при применении НПВП более 48 часов.

Заместитель директора

Ч.М. Мамбеталиева